



# ការគ្រប់គ្រងអ្នកជម្ងឺដែលមានជម្ងឺរាករូន្ទចរូន្ទរាវ

នៅមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់កណ្តាល ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ស្រុក និងនៅថ្នាក់មណ្ឌលសុខភាព



**និយមន័យករណីគ្លីនិក:** រាកមកសុទ្ធតែទឹកធ្ងន់ធ្ងរ (ជាញឹកញាប់ ដូចទឹកបបរ ហើយច្រើនតែមានក្លិនឆ្អាបដូចត្រី) ដោយមានឬគ្មានក្អក, ដោយមាន ឬគ្មានខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្លាប់, កើតឡើងចំពោះអ្នកជម្ងឺអាយុ ៥ឆ្នាំ ឡើងទៅ។

## ១. កំណត់ពីកម្រិតនៃការខ្សោះជាតិទឹក

ពិនិត្យរកមើល:	គ្មានខ្សោះជាតិទឹក	ខ្សោះជាតិទឹកខ្លះ	ខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ស្ថានភាពទូទៅ</li> <li>ភ្នែក</li> <li>មាត់ និងអណ្តាត</li> <li>ស្រែកទឹក</li> <li>ច្បាប់ស្បែក</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>សុខភាពល្អ រវាស់រវៃ</li> <li>ភ្នែកធម្មតា</li> <li>អណ្តាតសើម</li> <li>ដឹកធម្មតា មិនស្រែកទឹក</li> <li>ច្បាប់ស្បែក រលាទៅវិញធម្មតា</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>នៅមិនស្ងៀម ញញឹមញញើត</li> <li>ភ្នែកខ្វែង</li> <li>អណ្តាតស្ងួត</li> <li>ស្រែកទឹក ដឹកត្រហោបត្រហាប</li> <li>ច្បាប់ស្បែក រលាទៅវិញយឺតៗ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>អស់កម្លាំង ឬបាត់ស្មារតី</li> <li>ភ្នែកខ្វែងខ្លាំង និងស្ងួត</li> <li>ស្ងួតខ្លាំង</li> <li>ដឹកតិចតួច ឬមិនអាចដឹកបាន</li> <li>ច្បាប់ស្បែក រលាទៅវិញយឺតៗ ខ្លាំង</li> </ul>

## ២. ការព្យាបាលគ្រប់អ្នកជម្ងឺទាំងអស់ជាបន្ទាន់

**ការព្យាបាលពីដំបូងដោយប្រើទឹកអ្វីវ៉ាលីត គឺសម្រោះជីវិតអ្នកជម្ងឺដែលមានជម្ងឺរាករូន្ទចរូន្ទរាវ។**

**គ្មានខ្សោះជាតិទឹក**

អ្នកជម្ងឺអាចសម្រាកព្យាបាលនៅផ្ទះ។ ឱ្យអ្នកជម្ងឺផឹកទឹកអ្វីវ៉ាលីតបន្ទាប់ពីរាល់ពេលជុះរាកម្តងៗ ដោយអនុវត្តតាមកាលវិភាគខាងក្រោម:

អាយុ	បរិមាណទឹកអ្វីវ៉ាលីតបន្ទាប់ពីជុះរាកម្តងៗ គិតជា ម.ល	បរិមាណទឹកអ្វីវ៉ាលីតបន្ទាប់ពីជុះរាក ម្តងៗ គិតជា កែវ (២០០ម.ល)	ចំនួនកញ្ចប់អ្វីវ៉ាលីតដែលត្រូវការក្នុងមួយថ្ងៃ
តិចជាង ២៤ខែ	៥០-១០០ម.ល	១/៤-១/២កែវ	១/២កញ្ចប់/ថ្ងៃ
២-៥ឆ្នាំ	១០០-២០០ម.ល	១/២-១កែវ	១កញ្ចប់/ថ្ងៃ
១០ឆ្នាំ ឡើងទៅ	តាមតម្រូវការ	តាមតម្រូវការ	យ៉ាងតិច ២កញ្ចប់/ថ្ងៃ

- ប្រសិនបើអ្នកជម្ងឺក្អក សូមរង់ចាំ១០នាទី បន្ទាប់មកឱ្យទឹកអ្វីវ៉ាលីតដោយយឺតៗ។
- បន្តផ្តល់ទឹកអ្វីវ៉ាលីត និងជាតិទឹកបន្ថែមទៀតរហូតដល់ឈប់រាក។
- ប្រាប់អ្នកជម្ងឺឱ្យត្រឡប់មកមណ្ឌលសុខភាព ឬមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ ប្រសិនបើមិនធូរស្រាល ឬដឹកមិនបាន។
- ប្រសិនបើអ្នកជម្ងឺរីករាលដាលធ្ងន់ឡើង ចូរពិនិត្យមើលម្តងទៀត និងធ្វើការព្យាបាលទៅតាមកម្រិតនៃការខ្សោះជាតិទឹក។

**ខ្សោះជាតិទឹកខ្លះ**

បន្ទាប់ពីឱ្យអ្វីវ៉ាលីតហើយ សូមបញ្ជូនអ្នកជម្ងឺទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ឱ្យអ្នកជម្ងឺផឹកទឹកអ្វីវ៉ាលីតក្នុងអំឡុងពេល៤ម៉ោងដំបូងដោយអនុវត្តតាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម:

ទម្ងន់	អាយុ	បរិមាណទឹកអ្វីវ៉ាលីតក្នុងអំឡុងពេល៤ម៉ោងដំបូង
ក្រោម៥គ.ក	ក្រោម៤ខែ	២០០-៤០០ម.ល
៥-៧គ.ក	៤-១១ខែ	៤០០-៦០០ម.ល
៨-១០គ.ក	១២-២៣ខែ	៦០០-៨០០ម.ល
១១-១៥គ.ក	២-៤ឆ្នាំ	៨០០-១២០០ម.ល
១៦-២៥គ.ក	៥-១៥ឆ្នាំ	១២០០-២២០០ម.ល
៣០គក ឡើងទៅ	មនុស្សពេញវ័យ	២២០០-៤០០០ម.ល

**សំគាល់:**  
សូមប្រើអាយុកុមារតែពេលណាដែលអ្នកមិនដឹងពីទម្ងន់។  
ប្រសិនបើដឹងទម្ងន់ បរិមាណទឹកអ្វីវ៉ាលីត (ជាម.ល) អាចគណនាដោយគុណទម្ងន់អ្នកជម្ងឺ (ជាគ.ក) នឹង ៧៥។  
នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក សូមផ្តល់ថ្នាំជាតិស័ង្កសី ប្រសិនបើមានយោងទៅតាមពិធីសារណែនាំស្តីពីការប្រើថ្នាំនេះ។

ពិនិត្យឡើងវិញកម្រិតនៃការខ្សោះទឹករបស់អ្នកជម្ងឺបន្ទាប់ពី៤ម៉ោងក្រោយ និងធ្វើការព្យាបាលតាមការគួរ។

**ខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរ**

ដាក់ស្បើមឡាក់តាត ១០០មល/គក តាមសរសៃចែកស្បើមដូចខាងក្រោម:

អាយុ	មុនដំបូងឱ្យ ៣០មល/គក ក្នុងអំឡុងពេល:	បន្ទាប់មកឱ្យ៧០មល/គក ក្នុងអំឡុងពេល:
ក្រោម១២ខែ	១ម៉ោង	៥ម៉ោង
លើស១២ខែ និងមនុស្សពេញវ័យ	៣នាទី	២ម៉ោងកន្លះ

**ពិនិត្យមើលអ្នកជម្ងឺ:**

- ក្រោយពីបានឱ្យ ៣០ម.ល ដំបូង តាមសរសៃ
- ហើយបន្ទាប់មក រាល់១.២ម៉ោងម្តង
- ប្រសិនបើមិនធូរស្រាល ចូរដាក់ស្បើមស្បើមឡាក់ ឱ្យលឿនជាងមុន។

ពិនិត្យមើល៦ម៉ោងក្រោយ (សម្រាប់អ្នកជម្ងឺ អាយុក្រោម ១២ខែ) ឬ ៣ម៉ោងក្រោយ (សម្រាប់អ្នកជម្ងឺអាយុលើស១២ខែ) និងធ្វើការព្យាបាលតាមការគួរ។

**ប្រសិនបើអ្នកជម្ងឺរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរ សូមផ្តល់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ដូចខាងក្រោម:**

អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក	កម្រិតប្រើ និងរយៈពេល	កុមារ					បន្តផ្តល់ពេញវ័យ
		ក្រោម៤ខែ ក្រោម៥គក	៤-១២ខែ ១០គក	១២ខែ-១០ក្រោម ១៥គក	១០ក្រោម-១៥ក្រោម ២០គក	៥-១៥ឆ្នាំ ២០-៣០គក	
Ampicillin 500mg	25mg/kg/DOSE ២ដង/ថ្ងៃ រយៈពេល៧ថ្ងៃ	១/៤ក្រាប ២ដង/ថ្ងៃ រយៈពេល៧ថ្ងៃ	១/២ក្រាប ២ដង/ថ្ងៃ រយៈពេល៧ថ្ងៃ	១/២ក្រាប ២ដង/ថ្ងៃ រយៈពេល៧ថ្ងៃ	១ក្រាប ២ដង/ថ្ងៃ រយៈពេល៧ថ្ងៃ	១ក្រាប ២ដង/ថ្ងៃ រយៈពេល៧ថ្ងៃ	២+១/២ក្រាប ២ដង/ថ្ងៃ រយៈពេល៧ថ្ងៃ
Ciprofloxacin 250mg ក្រាប 500mg	10-15mg/kg/DOSE ១/២ដងក្រាប 250mg ១/២ដងក្រាប 500mg ២ដង/ថ្ងៃ រយៈពេល៧ថ្ងៃ	១/២ដងក្រាប 250mg ១/២ដងក្រាប 500mg ២ដង/ថ្ងៃ រយៈពេល៧ថ្ងៃ	១/២ដងក្រាប 250mg ១/២ដងក្រាប 500mg ២ដង/ថ្ងៃ រយៈពេល៧ថ្ងៃ	១ក្រាប ២ដង/ថ្ងៃ រយៈពេល៧ថ្ងៃ	១ក្រាប ២ដង/ថ្ងៃ រយៈពេល៧ថ្ងៃ	១ក្រាប ២ដង/ថ្ងៃ រយៈពេល៧ថ្ងៃ	២ដង/ថ្ងៃ រយៈពេល៧ថ្ងៃ

សូមកុំភ្លេចផ្តល់ថ្នាំជាតិស័ង្កសី យោងទៅតាមពិធីសារណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះ និងប្រសិនបើមានថ្នាំនេះនៅមន្ទីរពេទ្យ។



**ការព្យាបាលពីដំបូងដោយប្រើទឹកអ្វីវ៉ាលីត គឺសម្រោះជីវិតអ្នកជម្ងឺដែលមានជម្ងឺរាករូន្ទចរូន្ទរាវ!**

**ការព្យាបាលដោយប្រើឱសថអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក គួរប្រើសម្រាប់តែអ្នកជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណោះ!**

ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាមានជម្ងឺរាករូន្ទចរូន្ទរាវ ចូររាយការណ៍ជាបន្ទាន់ដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ជាតិ ខេត្ត និងស្រុក (ដោយប្រើទូរស័ព្ទ)

ក្នុងនាមអ្នកជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល អ្នកគួរអនុវត្តតាមគោលការណ៍អនាម័យដូចខាងក្រោម:

លាងដៃអ្នកជាមួយសាប៊ូ (ឬផេះប្រសិនបើគ្មានសាប៊ូ)

- មុនពេលរៀបចំអាហារ និង
- មុនពេលហូបអាហារ
- ក្រោយពេលប៉ះអ្នកជម្ងឺរាករូន្ទចរូន្ទរាវ

រំងាប់មេរោគសំលៀកបំពាក់អ្នកជម្ងឺសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតរបស់អ្នកជម្ងឺ និងកន្លែងដេក ដូចជាត្រែ ពូក ដោយ:

- ស្តោនិងទឹកក្តៅ
- ដាក់ក្នុងសូលុយស្យុងក្លរីន ឬ
- ចាក់ជាមួយសាប៊ូ និង/ឬដាក់ហាលថ្ងៃ

ប្រមូលលាមក និងកំអ្នកអ្នកជម្ងឺដាក់ក្នុងកន្ត្រៃ រួចចាក់ចោលក្នុងបង្គន់ឬកប់ចោល។ ប្រសិនបើអ្នកជម្ងឺក្អក ឬបន្ទោបង់ដាក់លើដី ចូរយកផេះមកចាក់ពិលើ មុននឹងកើបចេញ និងយកទៅចោល។