



# តើវាអាចជាការពុលមេតាណុល?

## 1 រោគសញ្ញា

0-12ម៉ោង  
(ឬលើសពីនេះ)  
បើមានជំងឺ  
Ethanol ឈាម  
ជាមួយ)

**មានប្រវត្តិផឹកគ្រឿងស្រវឹង?**

តើអ្នកជំងឺបានផឹកស្រាដែលផលិតខុសច្បាប់ ឬ ចូលរួមផឹកជាមួយអ្នកដែលសង្ស័យថាពុល មេតាណុលឬអត់?

12-24ម៉ោង  
(ឬលើសពីនេះ)  
បើមានជំងឺ  
Ethanol ឈាម  
ជាមួយ)

**មានអារម្មណ៍ឈឺក្បាលធំធេង(អាការៈស្រវឹង)?**

មានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន ក្អក ចង្អោរ។

**ឈឺទ្រូង ឬ រោគសញ្ញាក្រពះពោះវៀន?**

ឈឺទ្រូងខ្លាំង និង រោគសញ្ញាក្រពះពោះវៀន ឈឺពោះ។

**មានដង្ហើមញាប់/ដង្ហក់**

លើសពី 25 ដង /មួយនាទី។

**ការរំខាននៃការមើលឃើញ**

រាល់ការរំខាននៃការមើលឃើញគ្រប់ប្រភេទ, រាប់ចាប់តាំងពីការស្រវាំងភ្នែករហូតដល់មើលមិនឃើញទាំងស្រុង។

24-48ម៉ោង  
(ឬលើសពីនេះ)  
បើមានជំងឺ  
Ethanol ឈាមជាមួយ)

**សន្លប់ បាត់ស្មារតី**

## 2 ការព្យាបាល

**បើអ្នកជំងឺគ្មានរោគសញ្ញា:**

បន្តតាមដាន (សូមមើលរោគសញ្ញានៅខាងក្រោម ខាងឆ្វេង)។

**មានដង្ហើមញាប់/ដង្ហក់ ប៉ុន្តែគ្មានការរំខាននៃការមើលឃើញ:**

ឲ្យអេតាណុល និង ប៊ីកាបូណាត។តាមដានបន្តរយ៉ាងតិច 24ម៉ោង។

**មានដង្ហើមញាប់/ដង្ហក់ និង ការរំខាននៃការមើលឃើញ**

ឲ្យអេតាណុល និង ប៊ីកាបូណាត folinic (or folic) acid, ពិចារណាបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងលាងឈាម។

**មានដង្ហើមញាប់/ដង្ហក់ និង សន្លប់បាត់ស្មារតី:**

ឲ្យអេតាណុល និង ប៊ីកាបូណាត folinic (or folic) acid, បញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងលាងឈាម។

**ដង្ហើមធម្មតា ឬ ដង្ហើមខ្សោយ (ដកដង្ហើមមួយៗ)**

សន្លប់បាត់ស្មារតី: អាចជាការពុលមេតាណុលធ្ងន់ធ្ងរ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នវាអាចច្រលំជាមួយការពុល ethanol លើកលែងតែមានការជឿជាក់ច្បាស់ថាជាមេតាណុលពិតមែន។ឲ្យប៊ីកាបូណាត folinic (or folic) acid, ពិចារណាបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក។


## 3 កំរិតប្រើប្រាស់

**ផ្តល់ប៊ីកាបូណាត (Bicarbonate NaHCO<sub>3</sub>):**

- 500 mmol/L: ប្រើចំណុះ 250 -500 mL ឬ ច្រើនជាងហ្នឹង អំឡុង 1 – 2 ម៉ោង រហូតដល់ ការដកដង្ហើមញាប់ ត្រលប់មករកសភាពធម្មតាវិញ (ចង្វាក់ដង្ហើម <20 ដងក្នុង១នាទី)។
- 167 mmol/L: ប្រើចំណុះ 1000 - 1500 mL រឺ ច្រើនជាងហ្នឹង អំឡុង 1 – 2 ម៉ោង រហូតដល់ការដកដង្ហើមញាប់ មករកសភាពធម្មតាវិញ (ចង្វាក់ដង្ហើម <20 ដងក្នុង១នាទី)។
- ប្រសិនបើមានថ្នាំគ្រាប់ប៊ីកាបូណាតកំរិត 500mg (ស្មើនឹង 6mmol)** អាចប្រើពី 6 – 10 គ្រាប់រៀងរាល់ម៉ោង រហូតដល់ចង្វាក់ដង្ហើមត្រលប់មករកសភាពធម្មតាវិញ (ចង្វាក់ដង្ហើម <20 ដងក្នុង១នាទី)។

**អាស៊ីត Folinic (រឺ អាស៊ីត folic) :** ចាក់តាមសរសៃចំណុះ 50mg រឺ ប្រើថ្នាំគ្រាប់ (ឧ៖ 10 គ្រាប់ដែល មួយគ្រាប់មាន 5mg) រៀងរាល់ 6ម៉ោង ម្តង រយៈពេល 24 – 48 ម៉ោង។ **ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវធ្វើការ ស្ទង់ផ្លូវដង្ហើម (Intube) :** អ្នកជំងឺត្រូវបញ្ចូលខ្យល់ (ចង្វាក់ដង្ហើម > 25ដងក្នុងមួយនាទី) (រហូតដល់បញ្ជូនទៅដល់ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ (ICU)។ឲ្យ antidote (ethanol តាមមាត់ ឬ តាមសរសៃ) ដោយមិនរង់ចាំ។ សូមមើលកំរិតប្រើប្រាស់នៅខាងក្រោម។

ETHANOL:	5 % ETHANOL (beer)	10 % ETHANOL (wine)	20 % ETHANOL (fortified wine)	40 % ETHANOL (spirits)
<b>កំរិតចាប់ផ្តើម (Loading)</b>	15 mL/គីឡូ	7.5 mL/គីឡូ	4 mL/គីឡូ	2 mL/គីឡូ
<b>កំរិតជីក / ម៉ោង</b> (អ្នកជីកម្តងម្កាល)	2 mL/គីឡូ/ម៉ោង	1 mL/គីឡូ/ម៉ោង	0.5 mL/គីឡូ/ម៉ោង	0.25 mL/គីឡូ/ម៉ោង
<b>កំរិតជីក / ម៉ោង</b> (អ្នកប្រមឹកស្រា)	4 mL/គីឡូ/ម៉ោង	2 mL/គីឡូ/ម៉ោង	1 mL/គីឡូ/ម៉ោង	0.5 mL/គីឡូ/ម៉ោង



**តើពេលណាដែលអ្នកគួរស្វែងរកជំនួយ:**

បើមានអ្នកជំងឺដែលសង្ស័យខ្លាំងថាពុលមេតាណុល សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក ឬ ទាក់ទងទៅកាន់ការិយាល័យគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ..... ឬ ..... សំរាប់ជំនួយ និងពិភាក្សានៅអន្តរាគមន៍ដែលអាចធ្វើបាន។ហេតុផលមួយដែលសំខាន់ជាងគេគឺរកឲ្យឃើញថាមានការពុលស្រាក់ពុលកើតឡើង ដើម្បីចាប់ផ្តើមការព្យាបាល និងជូនដំណឹងទៅដល់សាធារណៈជនអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាន។

**បើមានករណីពុលទីមួយកើតឡើង ជានិច្ចជាកាលតែងតែមានករណីពុលជាបន្តបន្ទាប់**

