



**ក្រសួងសុខាភិបាល**

**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**

**សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល  
ស្តីពី**

**ការអប្បបរមាការកើនឡើងនៃជំងឺឈាមក្រហមដែលនិមាត់នៅដើមក្បាលនេះ  
និងវិធានការបង្ការជំងឺ**

ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមជម្រាបជូនសាធារណៈជនជ្រាបថា ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញការកើនឡើងនៃករណីជំងឺឈាមក្រហមដែលនិមាត់នៅដើមក្បាលនេះ នៅលើកុមារអាយុក្រោម៥ឆ្នាំ និងករណីខ្លះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវសំរាកនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារដើម្បីសង្រ្គោះបន្ទាន់ នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកើនឡើងកំដៅនេះ ។

ជំងឺឈាមក្រហម ដែលនិមាត់ នៅដើមក្បាលនេះ គឺជាជំងឺឆ្លងមួយប្រភេទកើតឡើង ញឹកញាប់ ចំពោះទារក និង កុមារ។ វាបង្កឱ្យមានរោគសញ្ញា គ្រុនក្តៅ មានជំងឺឈាមក្នុងមាត់ និង មានឈាមក្នុងន្ទាត់ លើបាតដៃ បាតជើង និង កំប៉េះគូទ។ វាកើតមាននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនពេញទូទាំងពិភពលោក។ ជំងឺឈាមក្រហម ដែលនិមាត់ នៅដើមក្បាលនេះ ភាគច្រើនជាជំងឺស្រាល ហើយអ្នកជំងឺ ស្ទើរតែទាំងអស់ជាសះស្បើយក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ទៅ ១០ ថ្ងៃ ដោយពុំចាំបាច់មានការព្យាបាល ហើយកម្រមានផលវិបាកណាស់ អ្នកជំងឺត្រូវបរិភោគទឹកអោយបានច្រើន ហើយអ្នកជំងឺអាចត្រូវការ ថ្នាំបញ្ចុះកំដៅ និងថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ ដែលបណ្តាលមកពីឈាមក្នុងមាត់។ មិនត្រូវប្រើថ្នាំ អាស៊ីរីន (aspirin) ដើម្បីបញ្ចុះកំដៅឡើយ។

ជាកម្រ ជំងឺឈាមក្រហម ដែលនិមាត់ នៅដើមក្បាលនេះ អាចបង្កឱ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួន រួមមាន រោគសញ្ញាប្រព័ន្ធប្រសាទ (សន្លឹម ប្រកាច់ ឬ កន្ត្រាក់ដៃជើង) និងរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើម (ហត់)។ អ្នកជំងឺដែលមានផលវិបាក ធ្ងន់ធ្ងរ ត្រូវ ប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុត ។ ជំងឺឈាមក្រហម ដែលនិមាត់ នៅដើមក្បាលនេះ អាចឆ្លង ពីមនុស្សម្នាក់ទៅ មនុស្សម្នាក់ទៀត ដោយការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងវត្ថុរាវ នៃផ្លូវដង្ហើម (ទឹកមាត់ កំហាក និងសំបោរ) ទឹករងៃ ដែលចេញពីឈាមក្រហម ឬ ឈាមក្រហម ដែលអ្នកជំងឺ អាចចម្លង ខ្លាំងបំផុតក្នុងសប្តាហ៍ទីមួយ។ ជំងឺឈាមក្រហម ដែលនិមាត់ នៅដើមក្បាលនេះ មិនឆ្លងពីមនុស្សទៅសត្វឬពីសត្វមកមនុស្សឡើយ។

បងប្អូនអាចការពារបានការឆ្លងជំងឺនេះ ដោយការអនុវត្ត អនាម័យល្អ និងការយកកូនទៅពេទ្យទាន់ពេល ប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរ។ អ្នកត្រូវលាងដៃកុមារអោយបានញឹកញាប់ជាមួយទឹកនិងសាប៊ូ ឬជាមួយទឹកអាល់កុល ជាពិសេសក្រោយប៉ះឈាមក្រហម ឬ ជំងឺ មុនពេលរៀបចំអាហារ មុនពេលបរិភោគ មុនបញ្ចុក ចំណីដល់ទារក ឬ កុមារ ក្រោយប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យ និងក្រោយប្តូរទ្រនាប់ គូទទារក ឬជូតសំអាតរាងកាយកុមារ។ លាងសំអាតថ្លៃនិង របស់ដែលប្រឈាក់ដោយទឹកនិងសាប៊ូ។ ជៀសវាងការប៉ះពាល់ស្ទិទស្ទាល (ថើប អាប ប្រើប្រាស់សម្ភារសំរាប់ហូបចុក រួមគ្នា។ល។) ជាមួយកុមារដែលមានជំងឺឈាមក្រហម ដែលនិមាត់ នៅដើមក្បាលនេះ អាចកាត់បន្ថយការឆ្លងផងដែរ។

ផ្តល់អាហារដែលមានជីវជាតិច្រើន និងទឹកស្អាតដល់កុមារ។ប្រើស្លាបព្រា និងបានដាច់ដោយឡែក សំរាប់កុមារនីមួយៗ។



*Handwritten signature*



**ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យ ម៉ែម ម៉ីនហេង** រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល មានប្រសាសន៍ថា - គ្រប់ៗគ្នា ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះជំងឺឈាម ដៃ ជើង និងមាត់ នៅពេលដែលអាកាសធាតុក្ដៅ ឡើងក្ដៅខ្លាំងនេះ តាមរយៈការរក្សាអនាម័យឲ្យបានល្អ នស្សាហ៍លាងដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹកឲ្យបានញឹកញាប់ ទាំងកុមារនិងអ្នកថែទាំកុមារ ។ បើកុមារឬទារកមានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដូចជា សន្លឹម ប្រកាច់ ឬ កន្រ្ទាក់ដៃជើង ឬរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើម (ហត់) ត្រូវប្រញាប់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុត ។

ក្រសួងសុខាភិបាលសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យសាធារណជនទូទៅអនុវត្តតាមដំបូន្មានសាមញ្ញខាងលើ ដើម្បីការពារកុមារនិងក្រុមគ្រួសារ និងសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់ឱ្យរស់នៅសុខភាពល្អ ។

ក្រសួងសុខាភិបាល និងបន្តធ្វើការជូនដំណឹងដល់សាធារណជន អំពីការវិវត្តនៃបញ្ហាសុខភាពតាមគេហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង [www.cdcmoh.gov.kh](http://www.cdcmoh.gov.kh) និងហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាល។

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ សូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ដោយឥតគិតថ្លៃ 115 ទោះគ្មានថវិកាក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទចូលបានដែរ ឬទំនាក់ទំនង៖ ក្រសួងសុខាភិបាល  
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លី ស៊ីវ៉ាន់ ៖ ០១២ ៨២៥ ៤២៤

ថ្ងៃសុក្រ ២ រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ពស ២៥៦២  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

